AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN TECHNIQUE DES STATIONS D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

Abonnement Annuel

PUBLICATION PERIODIQUE

EDITION DE LA STATION DU LANGUEDOC

(Tél. 92.28.72)

(AUDE, GARD, HERAULT, LOZERE, PYRENEES-ORIENTALES)
Régisseur de recettes, Direction Départementale de l'Agriculture, Maison de l'Agriculture - Bât. 5 - Place Chaptal
Boîte Postale 1078 - 34 MONTPELLIER
C.C.P. MONTPELLIER 5.238-57

DLP-8-5-70 056697

Nº 116 - MAI 1970/15
Régions I et 2 (PyrénéesOrientales)

DIASPIS PONTAGONA

(Cochenille du mûrier)

La dispersion (essaimage) des larves néonates a commencé en Roussillon; l'insecte est très vulnérable à ce stade mobile où il recherche un point de fixation.

Il est donc recommandé d'effectuer une pulvérisation à base d'oléoparathion (25 g/hl) ou de parathion émulsion (25 g/hl), avant le I2 mai. En raison
de l'étalement de l'"essaimage" ce traitement sera renouvelé entre le 26 et le
31 mai. Il est nécessaire de mouiller abondamment les arbres.

0 0

00

Appliquer le même traitement aux arbres envahis par la Cochenille virgule.

L.L. TROUILLON

L'Inspecteur de la Protection des Végétaux : BERVILLE

Tirage du 6 mai 1970

7412